

Стандарты лечения в дневном стационаре

Включают в себя проведение диагностических, лечебных или реабилитационных мероприятий больным, не требующим круглосуточного медицинского наблюдения, с применением современных технологий лечения и обследования больных в соответствии со стандартами и протоколами ведения больных, утвержденных настоящим приказом.

Показания и противопоказания к госпитализации в дневной стационар.

№ п/п	Нозологическая форма	Показания	Противопоказания
1.	Хронический бронхит	- ст. обострения - дыхательная недостаточность I-II ст. - с астматическим компонентом - Без астматического компонента	- дыхательная недостаточность III ст. - выраженный астматический компонент
2.	Бронхиальная астма (атопическая, инфекционно-аллергическая)	- средней тяжести (I-II ст.) - вне статуса - дыхательная недостаточность I-II ст.	-тяжелая форма - астматический статус - дыхательная недостаточность III ст.
3.	Гипертоническая болезнь	- I-II стадия Недостаточность кровообращения I-II стадии	- III стадия - частые гипертонические кризы - недостаточность кровообращения III ст. - тяжелые осложнения и сопутствующие заболевания
4.	ИБС: стенокардия напряжения	- I-II функциональный класс - недостаточность кровообращения I-II ст.	- III функциональный класс - нестабильная стенокардия - вариантная (Принцметала) - недостаточность кровообращения III

5.	ИБС: аритмическая форма	- экстрасистолия, мерцательная аритмия (постоянная форма) - недостаточность кровообращения I-II ст.	- пароксизмальная форма - впервые выявленная НК III ст.
6.	Вегетососудистая дистония	- период сосудистых пароксизмов	- частые сосудистые кризы
8.	Хронический гастрит, дуоденит, эзофагит	- ст. обострения	- выраженные болевые и диспептический синдромы
9.	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	- ст. обострения - впервые выявленная	- непрерывно рецидивирующее течение - тяжелые осложнения и сопутствующие заболевания - выраженный болевой и диспептический синдромы
10.	Хронический холецистит	- ст. обострения - без выраженной интоксикации	- желчнокаменная болезнь с частыми приступами желчной колики - выраженная интоксикация
11.	Постхолецистэктомический синдром	- ст. обострения	- выраженная секреторная недостаточность поджелудочной железы - выраженный болевой и диспептический синдром
12.	Хронический панкреатит	- ст. обострения - без выраженной интоксикации	- выраженная секреторная недостаточность поджелудочной железы - выраженный болевой и диспептический синдром

			- выраженная интоксикация
13.	Хронический гепатит	- персистирующий - алкогольный - без признаков ХПН	- явления хронической печеночной недостаточности
14.	Цирроз печени	- активность процесса I-II ст. - умеренно выраженный синдром портальной гипертензии - ХПН I ст.	- выраженная активность процесса - хроническая печеночная недостаточность II-III ст. - спленомегалия
15.	Сахарный диабет I, II тип.	- диабетическая ангиопатия - нейропатия - нефропатия	- ХПН II-III ст. Ангиопатия конечностей с ишемией III Б-IV ст.
16.	Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей	- I-III А ст.	- III Б-IV ст.
17.	Варикозная болезнь, хр. посттромбэмболический синдром, хр. венозная недостаточность.	- I-II ст.	- III ст. с тяжелыми трофическими нарушениями
18.	Остеоартроз, спондилез	- без выраженных нарушений	- выраженное ограничение двигательных функций
19.	Болезни межпозвоночных дисков	- обострение	- протрузии (грыжа) диска с компрессией позвонков
20.	Ишемическая болезнь мозга: атеросклероз сосудов головного мозга	- ХНМК I-II ст. - период сосудистых пароксизмов - через 6 месяцев после ОНМК	- ХНМК III ст. - выраженные нарушения двигательных функций - психические расстройства (изменение личности)

22.	Неврологические осложнения остеохондроза	- рефлекторные синдромы	- выраженные периферические парезы - тазовые расстройства
23.	Полиневропатия (токсическая)	- двигательные расстройства и чувствительные легкой и средней степени	- те же тяжелые
24.	Остаточные явления нейроинфекций	- пирамидные синдромы легкой и средней ст. тяжести - мозжечковые расстройства легкой и средней ст. тяжести	- выраженные когнитивные (корковые) нарушения - двигательные нарушения координации
25.	Рассеянный склероз	- двигательные чувствительные и координаторные расстройства легкой и средней ст. тяжести	- неврит или невропатия зрительного нерва (потеря зрительной функций) - тазовые расстройства - парапарезы - мозжечковые нарушения

**Средние сроки пребывания больных в дневном стационаре
согласно нозологиям.**

Наименование МЭС	Нормативная длительность лечения в ДС
1.Кардиология	
Гипертоническая болезнь I-III ст.	10(+1)
ИБС. Стенокардия напряжения II ФК. Аритмии (экстрасистолия, МА)	10(+1)
Вегетососудистая дистония (по симпатико-тоническому типу, ваготоническому типу). Диагноз, установленный впервые	10(+1)
2.Сосудистая хирургия	
Атеросклероз артерий нижних конечностей	10(+1)
Лимфоста	10(+1)
Облитерирующий эндартериит	10(+1)
Варикозная болезнь I-II ст	10(+1)
Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей с трофическими нарушениями	10(+1)
3.Неврология	
Остеохондроз позвоночника	10(+1)
Полиневропатии, полиневриты I степени тяжести: периферическая вегетативная нейропатия, вторичная не уточненная, кроме инфекционно-аллергического генеза	10(+1)
Невралгии, невриты, ганглиониты I степени тяжести: поражения	10(+1)
Отдаленные последствия инфекционных заболеваний	10(+1)

I степени тяжести	
Дисциркуляторная энцефалопатия I степени	10(+1)
Отдаленные последствия цереброваскулярной болезни I степени	10(+1)
Мигрень, синдром ВСД различного генеза	10(+1)
Хроническая нейросенсорная тугоухость	10(+1)
Эпилепсия, эписиндром. Легкая степень	10(+1)
Дисциркуляторная энцефалопатия атеросклеротическая, венозная на фоне вторичного поражения сосудов головного мозга II степени тяжести	10(+1)
Отдаленные последствия черепно-мозговой травмы с церебростеническим синдромом	10(+1)
4.Гастроэнтерология	
Язва желудка и 12-перстной кишки и другой локализации	10(+1)
Хронический холецистит, холангит	10(+1)
Дискинезия желчевыводящих путей с ранее установленным диагнозом	10(+1)
Хр. гастрит, хр. гастродуоденит, хр. дуоденит с ранее установленным диагнозом	10(+1)
Хр. гепатит персистирующий с ранее установленным диагнозом. Период обострения, период ремиссии	10(+1)
Болезни пищевода. Эзофагит. Язва пищевода	10(+1)
Цирроз печени	10(+1)
Хронические вирусные гепатиты В, С	10(+1)
Хронический панкреатит	10(+1)

5.Эндокринология	
Диабетическая ангиопатия, полинейропатия нижних конечностей	10(+1)
6.Аллергология	
Бронхиальная астма, легкая степень тяжести	10(+1)
Бронхиальная астма, средней степени тяжести	10(+1)
Острые аллергические заболевания (крапивница)	6(+1)
7.Пульмонология	
Хронический бронхит. Необструктивный. Бронхит неуточненный	10(+1)
Хронический бронхит. Обструктивный	10(+1)

Технологии лечения больных в дневном стационаре.

п/д	Нозология	Лекарственные средства для лечения в ДС
12-14	Атеросклероз сосудов нижних конечностей	1. Пентоксифилин 5.0 в/в на 200.0 физ. р-р № 10 2. Актовегин 5.0 в/в № 5 3. Никотиновая кислота 1%-2.0 в/м №10 4. Витамины В1, В6 в/м № 7 каждого
12-14	Варикозная болезнь нижних конечностей	1. Пентоксифилин 5.0 в/в на 200.0 физ. р-р № 10 2. Актовегин 5.0 в/в № 5 3. Никотиновая кислота 1%-2.0 в/м №10 4. Аспирин в защищенной оболочке 100 мг 1 раз в день
13-15	Осложнения сахарного диабета	1. Октолипен (Берлитион) 600 ЕД в/в на 200.0 физ.р-р №10 2. Пентоксифиллин 5.0 в/в на 200.0 физ.р-р№5 3. Актовегин 5.0 в/в №5 4. Пирацетам 5.0 №5 5. Витамины гр.В: Мильгамма в/м №5, вит.В1, В6, В12 в/м №3 каждого
13-15	Дисциркуляторная энцефалопатия смешанного генезиса	1. Винпоцетин 2.0 в/в на 200.0 физ. р-р №10 2. Цитофлавин 10.0 в/в на 200.0 физ. р - р№5 3. Пирацетам 5.0 в/в №5 4. Милдронат 5.0 в/в №5 5. Нейрокс 2.0 в/м №5 6. Эглонил 2.0 в/м №6

11-13	Остеохондроз позвоночника и неврологические осложнения	1. Диклофенак 3.0 в/м №5, (Кеторол 1.0, Кетанол 2.0 №10) 2. Мидокалм 1.0 в/м №5 3. Витамины В1, В6, В12 в/м № 4 каждого 4. Пентоксифиллин 5.0 в/в на 200.0 физ. р - р№5 5. Винпоцетин 2.0 в/в на 200.0 физ. р-р № 8 6. Нейрокс 2.0 в/в №10
13-15	Последствия перенесенных инсультов Примерная стоимость	1. Цераксон 1000 ед в/в на 200.0 физ. р-р №10 2. Церебролизин 5.0 в/в №5 3. Мексидол 2.0 в/м №5 4111 р.
9-11	Ибс. нарушение ритма	1. Панангин 10.0 (К, Mg смесь) в/в на 150 физ. р-р№5 2. Винпоцетин 2.0 на 200.0 физ.р-р № 6 3. Кардионат 5.0 в/в №5 4. Лазикс 2.0 в/в №3 5. Мексидол 2.0 №5 в/м 6. Бисопролол 5 мг 1 раз в день 7. Нитроглицерин 1 раз в день 8. Кардикет 40 мг 1-2 раза в день 5. Аспирин в защищенной оболочке 100 мг 1 раз в день 9. Симвастатин 10 мг 1 раз в день
9-11	Ибс. нарушение ритма	1. Панангин 10.0 (К, Mg смесь) в/в на 200.0 физ.р-р №7 2. Винпоцетин 2.0 на 200.0 физ. р-р № 4 3. Милдронат 5.0 в/в №5 6. Аспирин в защищенной оболочке 100 мг 1 раз в день 10. Симвастатин 10 мг 1 раз в день 11. Бисопролол 5 мг 1 раз в день

9-11	Гипертоническая болезнь 1-111стадии	1. Панангин 10.0 (К, Mg смесь) в/в на 150.0 физ.р-р№5 2. Кавинтон 2.0 в/в на 200.0 физ. р-р №6 3. Нейрокс 2.0 в/м №10 4. Лизиноприл 10 мгх2 раза в день 5. Лориста Н (50+12.5 мг), Лориста 50 мг 1 раз в день 6. Индапамид 2.5 мг, 1 раз в день. 7. Нифекард ХЛ 30, 60 мг, 1 раз в день 8. Бисопролол 5 мг, 1 раз в день.
6-8	Нейроциркуляторные дистонии Примерная стоимость	1. Ноотропил 5.0 в/в № 5 2. Мексидол 2.0 в/в №5 3. Винпоцетин 2.0 в/в на 200.0 физ. р-р №7 707 р.
14-15	Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки	1. Пилобакт АМ (при эрадикации) по схеме 2. Омепразол 20 мг (Ранитидин 150 мг, Фамотидин 40 мг) х2 раза в день 3. Мотилак 10 мг, 4 раза в день 4. Зантак 4.0 в/в на 200.0 физ. р-р №5 5. Зантак 2.0 в/в на 200.0 физ. р-р №10 6. Церукал 1.0 в/м №3 7. Но-шпа 2.0 в/м №5 8. Панкреатин 10 000 ЕД х3 раза в день 9. Солкосерил 5.0 в/в №5
11-13	Хронический гастродуоденит	1. Квамател 2.0 в/в на 200.0 физ.р-р№10 2. Но-шпа 2.0 в/м №5 3. Церукал 1.0 в/м №3 4. Мезим-форте 10 000 ЕД х3 раза в день 5. Мотилак 10 мгх4 раза в день 6. Омепразол 20 мг (Ранитидин 150 мг, Фамотидин 40 мг) х2 раза в день

11-13	Хронический панкреатит	1. Ацилок 2.0 в/в на 200.0 физ. р-р №10 2. Но-шпа 2.0 в/м №5 3. Церукал 1.0 в/м №3 4. Креон 10 000 ЕД х3 раза в день 5. Мотилак 10 мгх4 раза в день 6. Омепразол 20 мг (Ранитидин 150 мг, Фамотидин 40 мг) х2 раза в день 7. Мексидол 2.0 в/в №5
11-13	Хронический некалькулезный холецистит	1. Но-шпа 2.0 в/в №5 2. Церукал 1.0 в/м №3 3. Панкреатин 10 000 ЕД х3 раза в день 4. Мотилак 10 мгх4 раза в день 5. Аллохолх 3 раза в день 6. Квамател 2.0 в/в на 200.0 физ. р-р №10
11-13	Хронические гепатиты, цирроз печени	1. Реамберин 250.0 №5 2. Ремаксол 400 мл в/в №7 3. Цитофлавин 10.0 на 200.0 физ. р-р №5 4. Мексидол 2.0 в/м №10 5. Глюкоза 5% 200.0+ Аскорбиновая кислота 4.0-8.0 мл №3 6. Эссенциале 5.0 в/в на аутокрови №5 7. Гептрал 400 ЕД в/в на 200.0 физ. р-р. №5 8. Капс.Эссенциале 2кх3 раза в день 9. Таб.Гептрал 400 ЕД х 2 раза в день 10. Вит. группы В (В1, В6, В12) в/м №10 11. Мезим-форте 10 000 ЕДх3 раза в день
11-13	Хронические бронхиты	1. Кагоцел, на курс 18 таб 2. Зи-фактор 500 мг, 1 раз в день №3 3. АЦЦ 600 мг, 1 раз в день №7 4. Бромгексин 8 мг (Амбробене), 1 др.х3 раза в день 5. Лоратадин 10 мг, 1 раз в день №10 6. Тиосульфат натрия 10.0 на 200.0 физ. р-р №12 7. Эуфиллин 2.4%- 5.0 на 200.0 физ. р-р №5

13-15	Бронхиальная астма (легкой, средней тяжести)	1. Базисная терапия 2. Эуфиллин 2.4%- 5.0-10.0 на 200.0 физ. р-р №10 3. Преднизолон 60.0 в/в на 100.0 физ. р-р №3
5-7	Острые аллергические состояния	1. Преднизолон 60.0 на 200.0 физ. р-р №3 2. Тиосульфат 10.0 в/в №7 3. ГКС мази 4. Тавегил 1.0 в/м №7